

«Пентиум» хорошо, а ум лучше

А.БААБАБОВ

*Напрасно умный очи пучит
на жизнь дурацкую мою,
ведь то, что умный только учит,
я много лет преподаю.*

И.Губерман

В СТАТЬЕ «УМ ХОРОШО, А ПЯТЬ – ЛУЧШЕ» («КВАНТ» №6 за 1998 год) И. Ф. Акулич рассказал о трех задачах, в исследовании которых помог компьютер, причем именно компьютер с процессором «Пентиум» (заграничный, быстродействующий, самый-самый хороший). При этом он сформулировал настолько интересные гипотезы, что могло показаться: пора математикам отбросить ручки и начать экспериментировать с «Пентиумом» в поиске новых истин; сотни мегагерц позволяют любому программисту встать во главе целого ученого совета, вычислительная мощь которого колоссально превышает возможности любого ученого сообщества докомпьютерной эры.

Но это только на первый взгляд. А на деле статья Акулича – яркое доказательство древней мощи математики: теоретическое рассмотрение позволяет получить во всех трех задачах точные ответы! У великого английского физика лорда Рэля (1842–1919) не было «Пентиума», а решение первой задачи он знал!! У Леонарда Эйлера (1707–1783) не было калькулятора, а изученная им гамма-функция позволяет дать точный ответ не только во второй задаче, но и в гораздо более общих ситуациях!!!

Но хватит восклицаний. Перейдем к точным формулировкам и весьма поучительным доказательствам.

Две последовательности

В первой задаче речь идет о разбиении натурального ряда на две возрастающие непересекающиеся последовательности $a_1 < a_2 < a_3 < \dots$ и $b_1 < b_2 < b_3 < \dots$, которые при любом натуральном n удовлетворяют условию $b_n = a_n + n$. Двигаясь по натуральному ряду, можно последовательно вычислять члены обеих последовательностей.

b_1	b_2	b_3	b_4	b_5	b_6	b_7	b_8	b_9	b_{10}	b_{11}	a_1	a_2	a_3	a_4	a_5	a_6	a_7	a_8	a_9	a_{10}	a_{11}	a_{12}	a_{13}	a_{14}	a_{15}	a_{16}	a_{17}									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	...

Этот процесс очень хорошо описан в статье Акулича. А именно, поскольку $a_n < b_n$, наименьшее натуральное число, т. е. 1, должно равняться a_1 , откуда немедленно $b_1 = 1 + 1 = 2$. Теперь ясно, что наименьшее свободное число, т. е. 3, – это a_2 , откуда $b_2 = 3 + 2 = 5$. После этого наименьшим неиспользованным числом оказывается $a_3 = 4$, откуда $b_3 = 4 + 3 = 7$. Так можно действовать бесконечно, *каждый раз выбирая наименьшее неиспользованное натуральное число и именно его полагая равным a_n , а затем вычисляя $b_n = a_n + n$* . (Советую выписать через запятую первые 50 натуральных чисел и применить этот алгоритм – сразу увидите, насколько все просто!)

Не получится ли так, что очередное вычисленное значение a_n или b_n окажется уже занято каким-то ранее определенным a_m или b_m , где $m < n$? Нет, не получится: a_n , как сказано выше, есть наименьшее натуральное число, отличное от $a_1 < a_2 < \dots < a_{n-1}$ и от $b_1 < b_2 < \dots < b_{n-1}$, и потому a_n не может совпадать ни с одним из них; число $b_n = a_n + n > a_{n-1} + n - 1 = b_{n-1}$ тоже не может ни с чем совпасть.

Упражнение 1. Найдите a_{31} .

Гипотеза Акулича и явные формулы

Продлав при помощи «Пентиума» вычисления для первых нескольких миллионов натуральных чисел, Акулич пришел к красивой и смелой гипотезе: *отношение количества a -чисел к количеству b -чисел стремится к «золотому сечению» $(1 + \sqrt{5})/2$* .

Эта гипотеза верна. Более того,

$$a_n = \left[(1 + \sqrt{5})n/2 \right], \quad (1)$$

$$b_n = a_n + n = \left[(1 + \sqrt{5})n/2 \right] + n = \left[(3 + \sqrt{5})n/2 \right],$$

где квадратные скобки обозначают целую часть, т. е. $[x]$ – это наибольшее целое число, не превосходящее числа x .

Прежде чем доказывать эти явные формулы, давайте выведем из них гипотезу Акулича. Обозначим для краткости $\alpha = (1 + \sqrt{5})/2$ и $\beta = (3 + \sqrt{5})/2$. Рассмотрим произвольное натуральное число N и выясним, сколько a -чисел и сколько b -чисел среди первых N натуральных чисел, если последовательности заданы формулами $a_n = [n\alpha]$ и $b_n = [n\beta]$.

Неравенство $a_n \leq N$ равносильно, по определению целой части, неравенству $n\alpha < N + 1$, т. е. неравенству $n <$

$(N + 1)/\alpha$. Значит, a -чисел среди первых N натуральных чисел имеется ровно $[(N + 1)/\alpha]$. Аналогично, b -чисел $[(N + 1)/\beta]$.

Итак, отношение количества a -чисел к количеству b -чисел есть $[(N + 1)/\alpha]/[(N + 1)/\beta]$. Устремим N к бесконечности: отбрасывая знак целой части, в пределе получаем отношение

$$\frac{\beta}{\alpha} = \frac{3 + \sqrt{5}}{1 + \sqrt{5}} = \frac{1 + \sqrt{5}}{2}.$$

Гипотеза доказана; точнее, она выведена из формул (1).

Упражнение 2. При помощи калькулятора убедитесь, что следующая таблица заполнена правильно:

n	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
$\lceil (1 + \sqrt{5})n/2 \rceil$	1	3	4	6	8	9	11	12	14	16	17	19	21	22	24	25	27	29
$\lceil (3 + \sqrt{5})n/2 \rceil$	2	5	7	10	13	15	18	20	23	26	28	31	34	36	39	41	44	47

натуральных чисел m и n должны быть выполнены неравенства

$$\alpha m < k < k + 1 < \alpha(m + 1),$$

$$\beta n < k < k + 1 < \beta(n + 1),$$

которые мы преобразуем к виду

$$\frac{m}{k} < \frac{1}{\alpha} < \frac{m+1}{k+1}, \quad \frac{n}{k} < \frac{1}{\beta} < \frac{n+1}{k+1}.$$

Доказательство

Как же доказать замечательные формулы (1)? И неужели я первый догадался рассмотреть выражения $\lceil \alpha n \rceil$ и $\lceil \beta n \rceil$? Нет, в 1877 году в «Теории звука» лорд Рэлей писал: «Если x есть некоторое положительное иррациональное число, меньшее единицы, то можно взять два ряда величин n/x и $n/(1-x)$, где $n = 1, 2, 3, \dots$; каждое число, принадлежащее к тому или иному ряду, и только оно одно, будет заключено между двумя последовательными натуральными числами». Другими словами, последовательности $a_n = \lceil n/x \rceil$ и $b_n = \lceil n/(1-x) \rceil$ заполняют без пропусков и перекрытий весь натуральный ряд, если $0 < x < 1$ и $x \notin \mathbb{Q}$.

Интересующие нас явные формулы получаются из формул Рэрея при $x = 2/(1 + \sqrt{5})$, поскольку при этом величина $1-x$ равна как раз $2/(3 + \sqrt{5})$ (проверьте!).

В общем случае, обозначив $\alpha = 1/x$ и $\beta = 1/(1-x)$, можно переформулировать утверждение Рэрея следующим образом¹:

Теорема 1. Если α и β – положительные иррациональные числа, связанные соотношением $\frac{1}{\alpha} + \frac{1}{\beta} = 1$, то среди чисел вида $\lceil \alpha n \rceil$ и $\lceil \beta n \rceil$, где $n \in \mathbb{N}$, каждое натуральное число встречается ровно один раз.

Доказательство. Поскольку $\alpha > 1$, в последовательности $\lceil \alpha \rceil, \lceil 2\alpha \rceil, \lceil 3\alpha \rceil, \dots$ никакое число не повторяется. Аналогично, вследствие неравенства $\beta > 1$, строго возрастает и последовательность $\lceil \beta \rceil, \lceil 2\beta \rceil, \lceil 3\beta \rceil, \dots$

Дальше доказательство ведем методом «от противного». Предположим сначала, что некоторое натуральное число k вошло в обе последовательности, т. е. $k = \lceil \alpha m \rceil = \lceil \beta n \rceil$, где m, n – натуральные числа. Тогда должны быть выполнены неравенства

$$k < \alpha m < k + 1, \quad k < \beta n < k + 1,$$

т.е.

$$\frac{m}{k+1} < \frac{1}{\alpha} < \frac{m}{k}, \quad \frac{n}{k+1} < \frac{1}{\beta} < \frac{n}{k}.$$

Сложим эти неравенства, не забыв использовать условие $\frac{1}{\alpha} + \frac{1}{\beta} = 1$. Получим

$$\frac{m+n}{k+1} < 1 < \frac{m+n}{k},$$

откуда

$$k < m + n < k + 1.$$

Но такого для натуральных чисел не бывает! Значит, число k не могло войти в обе рассматриваемые последовательности.

Теперь предположим, что натуральное число k не вошло ни в одну из последовательностей. Тогда для некоторых

Складывая, получаем

$$\frac{m+n}{k} < 1 < \frac{m+n+2}{k+1},$$

откуда $m+n < k$ и $k+1 < m+n+2$, что невозможно для натуральных чисел. Получили желанное противоречие. Теорема доказана.

Хотя мне нравится это доказательство, есть и более короткий способ.² Левее любого натурального числа N лежат $\lceil N/\alpha \rceil$ членов первой последовательности и $\lceil N/\beta \rceil$ членов второй. Поскольку α иррационально, числа N/α и N/β имеют ненулевые дробные части. Далее, сумма

$$\frac{N}{\alpha} + \frac{N}{\beta} = N$$

является целым числом, так что дробные части слагаемых дополняют друг друга, т.е. в сумме дают в точности 1. Значит, сумма целых частей $\lceil N/\alpha \rceil + \lceil N/\beta \rceil$ равна $N-1$, т.е. левее числа N лежит в точности $N-1$ членов этих последовательностей. Как легко понять, просматривая натуральный ряд слева направо (любитель строгости сказал бы: применяя индукцию), это как раз означает, что рассматриваемые последовательности однократно покрывают натуральный ряд.

Упражнения

3. Докажите, что последовательности, заданные формулами $a_n = \lceil n\sqrt{2} \rceil$ и $b_n = a_n + 2n$, заполняют весь натуральный ряд без пропусков и перекрытий.

4. Найдите явные формулы для возрастающих последовательностей a_n и b_n , заполняющих натуральный ряд без пропусков и перекрытий и удовлетворяющих соотношению $b_n = a_n + 3n$ при всех $n = 1, 2, 3, \dots$

5. Докажите утверждение, обратное теореме 1: если α, β – положительные числа и если последовательности $a_n = \lceil \alpha n \rceil$ и $b_n = \lceil \beta n \rceil$ покрывают натуральный ряд без пропусков и перекрытий, то $\frac{1}{\alpha} + \frac{1}{\beta} = 1$, причем числа α и β иррациональны.

6. Выведите из трех предыдущих упражнений, что числа $\sqrt{2}$ и $\sqrt{13}$ иррациональны.³

7. Пусть a – положительное иррациональное число, $b = 1/a$. Докажите, что между любыми двумя последовательными натуральными числами содержится одно и только одно из чисел $1+a, 2(1+a), 3(1+a), \dots$ и $(1+b), 2(1+b), 3(1+b), \dots$

Замечание. Последнее упражнение имеет номер 38 в книге «Избранные задачи из журнала «American Mathematical Monthly» (М., Мир, 1977). Следующее упражнение – задача 294 из той же книги.

8. Для натурального числа $a > 4$ рассмотрим две последовательности $f(n)$ и $g(n)$ натуральных чисел, заданные условиями $f(1) =$

² Мне кажется, его чуть сложнее понять или придумать. Впрочем, не будем спорить о вкусах.

³ Только не подумайте, пожалуйста, что я хочу заменить этим способом привычное доказательство из школьного учебника. Нет, это всего лишь шутка. Шутка!

¹ С этого момента, заметьте, числа α и β не обязательно суть $(1 + \sqrt{5})/2$ и $(3 + \sqrt{5})/2$.

$= 1, g(n) = na - 1 - f(n)$ и, наконец, $f(n+1)$ – наименьшее натуральное число, отличное от каждого из $2n$ чисел $f(1), f(2), \dots, f(n), g(1), g(2), \dots, g(n)$. Докажите, что существуют такие числа α и β , что $f(n) = [\alpha n], g(n) = [\beta n]$.

9. а). Пусть $\alpha = (1 + \sqrt{5})/2$. Докажите для любого натурального числа n равенство $[n\alpha^2] = [\alpha[\alpha n]] + 1$.

б) Пусть последовательность всех натуральных чисел разбита на две непересекающиеся подпоследовательности $f(1) < f(2) < f(3) < \dots$ и $g(1) < g(2) < g(3) < \dots$, причем $g(n) = f(f(n)) + 1$ для любого n . Найдите $f(240)$. (Этот пункт в 1978 году предлагался на Международной математической олимпиаде и вошел в «Задачник «Кванта» под номером М538.)

10. Пусть $\alpha > 1, \beta > 1$ и $\frac{1}{\alpha} + \frac{1}{\beta} = 1$. Докажите, что каждое

натуральное число входит в одну и только одну из последовательностей $a_n = [\alpha n]$ и $b_n = [\beta n] - 1$, где через $[x]$ обозначено наименьшее целое число, которое больше или равно числу x (иначе говоря, $[x] = -[-x]$).


Геометрическая интерпретация

*Что для нас – головоломка,
духом тайны разум будит –
очевидно, для потомка
просто школьным курсом будет.*

И.Губерман

Теорема 1 настолько красива, что возникает желание глубже проникнуть в суть дела. Пусть, как и ранее, α и β – положительные иррациональные числа, причем $\frac{1}{\alpha} + \frac{1}{\beta} = 1$. Тогда $\beta + \alpha = \alpha\beta$, откуда $(\alpha - 1)(\beta - 1) = 1$.

Нарисуем на клетчатой бумаге (см. рисунок) как на координатной плоскости прямую l , заданную уравнением $y = (\alpha - 1)x$, которое можно записать также в виде $x = (\beta - 1)y$. Занумеруем подряд все клетки, которые пересекает l , начиная с нулевой клетки, которой принадлежит начало координат (на рисунке взято $\alpha = (1 + \sqrt{5})/2$). Поскольку число α иррационально, прямая l не проходит через узлы сетки (кроме, разумеется, начала координат).



Значит, l входит в очередную клетку либо слева, пересекая вертикальную линию сетки, либо снизу, пересекая горизонтальную линию.

Если l вошла в клетку слева и пересекла при этом вертикаль $x = n$, то номер клетки, в которую при этом вошла прямая, равен $n + [(\alpha - 1)n] = [\alpha n]$. (Это не очевидно? Согласен. Но если занумеровать не только клетки, которые пересекает l , а вообще присвоить номер $n + m$ каждой клетке, заданной неравенствами $n \leq x < n + 1, m \leq y < m + 1$, то ситуация вполне прояснится.) Если же прямая l снизу пересекла горизонталь $y = m$, то номер соответствующей клетки равен $[(\beta - 1)m] + m = [\beta m]$.

Вот и все. Согласитесь, это геометрическое доказательство теоремы 1 достойно восхищения! И хотя можно было бы еще очень многое рассказать (последовательности $a_n = [n(1 + \sqrt{5})/2], b_n = [n(3 + \sqrt{5})/2]$ связаны и с игрой цзяньшицзы, и с числами Фибоначчи, и со многими другими интересными задачами), я ограничусь советом прочитать статью И.М.Яглома «Две игры со спичками» («Квант» №1 за 1992 год) и статью А.Ю.Матулиса, А.Ю.Савушкина «Ферзя – в угол, «цзяньшицзы» и числа Фибоначчи» («Квант» №7 за 1984 год).

(Окончание следует)